



Arkorrektion

capiodk.dk



Capiro

Del af Ramsay Santé

Skæmmende ar efter tidligere operationer eller ulykker kan ved hjælp af en operation oftest gøres pænere. I dette informationsmateriale kan du læse, hvordan operationen foregår, og hvad du kan forvente af operationen.

FØR OPERATIONEN

Før operationen skal du til forundersøgelse hos speciallægen. Her bliver du informeret om operationen, senfølger og eventuelle komplikationer. Speciallægen vil også informere dig om det forventede kosmetiske resultat. Du er velkommen til at tage en ven eller et familiemedlem med til forundersøgelsen.

Der skal gå mindst én uge fra forundersøgelsen til operationen, hvis indgrebet betragtes som udelukkende kosmetisk betinget.

PÅ OPERATIONS DAGEN

Når du møder op på hospitalet, får du anvist en seng af en sygeplejerske. Herefter vil den kirurg, som skal operere dig, komme og hilse på dig, og afhængig af bedøvelsens art får du også besøg af en narkoselæge.

Der kan gå fra 30 min.-1½ time fra din ankomst til selve operationen går i gang.

BEDØVELSE

Operationen foretages oftest i lokalbedøvelse. Læs venligst særskilt vejledning om det-te.

OPERATIONEN

Kirurgen tegner snittet op og fjerner det skæmmende arvæv. Det gøres evt. ved hjælp af et zig-zag-ar for at korrigere for en eventuel stramning i arvævet. Når arvævet er fjernet, sys med små tråde, og der lægges en plasterbandage.

EFTER OPERATIONEN

Ved udskrivelsen får du udleveret smertestillende medicin samt kirurgens telefonnummer.

Trådene skal typisk fjernes, og tidspunktet afhænger af, hvor på kroppen arvævet er fjernet.

Du skal beholde plaster på indtil trådfjernelsen. Du kan dog godt gå i bad dagen efter operationen.

Du skal undgå kraftige bevægelser af det område, hvor operationen er foretaget.

SENFØLGER OG EVENTUELLE KOMPLIKATIONER

Operationen vil efterlade et ar, som er mere eller mindre synligt, alt afhængig af hvor på kroppen det skæmmende ar er fjernet.

Betændelse og blodansamlinger er sjældne, og det er ligeledes meget sjældent, at såret springer op (< 1 %). Der kan i starten være let ømhed og siven fra såret.

Indtrækninger i området kan forekomme. Hvis arvævet efter operationen bliver ophøjet og fortykket, kan det være nødvendigt at behandle med binyrebarkhormon.

KONTAKT

Er der noget, du er i tvivl om, eller har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os.

Hellerup: 3977 7070

Odense: 6548 7070

Aarhus: 8612 1186

Skørping: 9839 2244

Viborg: 8725 0899

Telefontider:

Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00

Fredag kl. 8.00-16.00

info@capiro.dk

www.capiro.dk

Undertegnede er informeret om ovenstående:

Dato

CPR-nr.

Underskrift

○ **Hellerup**
Hans Bekkevolds Allé 2B
2900 Hellerup
Tlf.: 3977 7070

○ **Odense**
Pantheonsgade 25
5000 Odense C
Tlf.: 6548 7070

○ **Aarhus**
Margrethepladsen 3
8000 Aarhus C
Tlf.: 8612 1186

○ **MR Aarhus**
Morten Børups Gade 8
8000 Aarhus C
Tlf.: 8612 1200

○ **Viborg**
Stadion Allé 7
8800 Viborg
Tlf.: 8725 0899

○ **Skørping**
Himmerlandsvej 36
9520 Skørping
Tlf.: 9839 2244

info@capiro.dk • capiro.dk

Telefontider:

Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00

Fredag kl. 8.00-16.00

