



Brystvortereduktion

capiro.dk



Capiro

Del af Ramsay Santé

Er brystvorteområdet for stort, kan det reduceres ved hjælp af en operation. Det kan være, at det er selve brystvorten, der er for stor, men det kan også være, at det er det brunpigmenterede område udenom brystvorten, der ønskes formindsket.

FØR OPERATIONEN

Før operationen skal du til en forundersøgelse hos en speciallæge. Her vil du blive informeret om operationen, senfølger og eventuelle komplikationer. Speciallægen vil informere dig om det forventede kosmetiske resultat.

Du er velkommen til at tage en ven eller et familiemedlem med til forundersøgelsen.

Der skal gå mindst én uge fra forundersøgelsen til operationen, hvis indgrebet betragtes som udelukkende kosmetisk betinget.

BEDØVELSE

Operationen foregår som oftest i lokalbedøvelse. Læs venligst særskilt vejledning om dette.

OPERATIONEN

Når du møder op, får du anvist en seng af en sygeplejerske. Herefter vil den kirurg, som skal operere dig, komme og hilse på dig, og afhængig af bedøvelsens art får du også besøg af en narkoselæge.

Der kan gå fra 30 min.-1½ time fra ankomst, til selve operationen vil blive foretaget.

Er det selve brystvorten, som er for stor, kan denne reduceres ved hjælp af et snit, som lægges ved brystvortens basis. Herefter fjernes et stykke hud hele vejen rundt.

Drejer det sig om det brune område omkring brystvorten, kan dette reduceres ved at fjerne et stykke af området cirkulært og herefter sy den upigmenterede hud til den resterende hud. Derved efterlader operationen et ar rundt omkring brystvorten.

Hvis det drejer sig om et større område, må man, udover at fjerne et cirkulært stykke hud, også fjerne lidt hud under brystvorten. Man efterlader derved et ar rundt om brystvorten samt et ar, der strækker sig fra brystvorten og ned mod folden under brystet.

EFTER OPERATIONEN

Umiddelbart efter operationen kan du som regel udskrives. Ved udskrivelsen får du udleveret smertestillende medicin samt kirurgens telefonnummer.

Normalt er der en vis ømhed efter operationen,

men egentlige smerter er usædvanligt. Der vil være hævelse og misfarvning af vævet i 3-4 uger efter operationen.

Du skal regne med at holde fri fra dit arbejde et par dage efter operationen.

EVENTUELLE KOMPLIKATIONER OG SENFØLGER

Ar

Arrene kan efter operationen være røde og hævede, hvilket fortager sig efter 3-6 måneder. Herefter vil de som regel ses som en hvid streg.

Føleforstyrrelser

Føleforstyrrelser i og omkring brystvorten og operationsområdet forsvinder ofte efter et par måneder, men kan hos enkelte patienter være permanente.

Blødning og betændelse

Blødning og betændelse efter operationen ses sjældent (hos under 1 %).

DET FORVENTEDE RESULTAT

Lever resultatet ikke op til forventningerne, kan en ny operation komme på tale. Det er dog ikke i alle tilfælde muligt at operere til et mere tilfredsstillende resultat.

Resultatet holder mange år afhængig af genetiske dispositioner. Vævet vil selvfølgelig følge de almindelige aldersforandringer.

KONTAKT

Er der noget, du er i tvivl om, eller har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os.

Hellerup: 3977 7070

Odense: 6548 7070

Aarhus: 8612 1186

Skørping: 9839 2244

Viborg: 8725 0899

Telefontider:

Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00

Fredag kl. 8.00-16.00

info@capiro.dk

www.capiro.dk

Undertegnede er informeret om ovenstående:

Dato

CPR-nr.

Underskrift

○ **Hellerup**
Hans Bekkevolds Allé 2B
2900 Hellerup
Tlf.: 3977 7070

○ **Odense**
Pantheonsgade 25
5000 Odense C
Tlf.: 6548 7070

○ **Aarhus**
Margrethepladsen 3
8000 Aarhus C
Tlf.: 8612 1186

○ **MR Aarhus**
Morten Børups Gade 8
8000 Aarhus C
Tlf.: 8612 1200

○ **Viborg**
Stadion Allé 7
8800 Viborg
Tlf.: 8725 0899

○ **Skørping**
Himmerlandsvej 36
9520 Skørping
Tlf.: 9839 2244

info@capiro.dk • capiro.dk

Telefontider:

Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00

Fredag kl. 8.00-16.00

