



Fjernelse af polypper hos børn og anlæggelse af dræn i ørerne



FJERNELSE AF POLYPPER

Undertryk, væske og eventuelt gentagne tilfælde af akut mellemørebetændelse er meget almindeligt hos børn. Årsagen til dette er oftest, at det Eustakiske rør (forbindelsen mellem mellemøret og næsesvælget) er lukket - enten på grund af hævede slimhinder i næsesvælget som følge af tilbagevendende øvre luftvejsinfektioner eller på grund af "børnepolypper" (adenoide vegetationer), som består af hævet lymfevæv i næsesvælget. Foruden væske i ørerne, som giver nedsat hørelse, vil der ofte være andre symptomer så som "snork, snot og snøvl".

Ved symptomer på børnepolypper er behandlingen fjernelse af det hævede lymfevæv i næsesvælget. Ved væske i ørerne eller ved gentagne mellemørebetændelser er behandlingen isætning af dræn (lille rør) i trommehinden.

BEDØVELSE

Operationen foregår i helbedøvelse og varer ca. 20 minutter. Under hele forløbet bliver du overvåget af anæstesilægen. Se endvidere folderen "Information om fuldbedøvelse og spinalbedøvelse".

OPERATIONEN

Fjernelse af polypper (adenoide vegetationer), der er beliggende i næsesvælget, fjernes gennem munden.

Indlæggelse af dræn i trommehinden (tubulation) foregår gennem øregangen ved anvendelse af et operationsmikroskop. Formålet med operationen er at etablere et hul gennem trommehinden, således at undertrykket i mellemøret kan udlignes, og mellemørebetændelsen ikke opstår.

OPVÅGNINGEN

Når operationen er afsluttet, og du er vågnet, bliver du kørt til sengeafsnittet. Her vil du blive overvåget af specielt uddannet personale, indtil udskrivning er forsvarlig.

Enkelte patienter vil efter bedøvelsen kunne få kvalme og opkastning. Er der optræk til kvalme, vil der blive tilbudt kvalmestillende medicin.

SMERTER EFTER OPERATIONEN

Den smertebehandling, der skal gøre det nemmere at komme igennem de første dage efter operationen, påbegyndes allerede før operationen med den Panodil-dosis, som anæstesilægen anbefaler. Vi anvender den medicin, der står anført nedenfor.

Under indlæggelsen kan der i meget sjældne tilfælde være behov for stærkere smertestillende midler fra morfingruppen, men det er i så fald kun nødvendigt i timerne under og lige efter operationen.

SMERTEBEHANDLING

Mod smerter anbefales Panodil® og Ibuprofen® - et gigtmiddel, som virker godt på smerter i halsen.

Børn

For børns vedkommende giver man Panodil som mikstur eller stikpiller og Diclon som tabletter eller stikpiller. I forbindelse med udskrivningen vil der blive givet anvisning på, hvor meget man skal give.

Maksimal dosis for Panodil: 100 mg/kg/døgn. Dvs. et barn der vejer 20 kg må få 500 mg 4 gange i døgnet = 2000 mg.

Maksimal dosis for Diclon: 3 mg/kg/døgn, hvilket for et barn på 20 kg svarer til 60 mg/døgn.

Tabletterne og stikpillerne findes i størrelse på 50 mg. Stikpillen kan deles i 2, således at barnet må få ½ stikpille højst 2 gange dgl.

Ud over medicinen anbefaler vi is – køligheden virker i sig selv smertestillende.

Hvis der kun lægges dræn i trommehinden, er der som oftest ikke behov for smertestillende.

Ved fjernelse af polypper er der oftest kun behov for Panodil.

KOMPLIKATIONER

Komplikationer er sjældne. Det vil typisk dreje sig om blødning.

ALMINDELIGT BESVÆR - HJEMME

Kortvarigt øreflåd i dagene efter dræning er helt normalt. Hvis øreflåddet varer mere end en uge, behandles sædvanligvis med penicillin.

I meget sjældne tilfælde kan der komme kraftigere blødning, og så er det nødvendigt at kontakte os.

KOST

Hvis der fjernes polypper, skal kosten være blød og afkølet de første par døgn. Spis gerne is.

KONTROL

Det er meget varierende, hvor længe trommehindedrænet bliver siddende – i gennemsnit ca. 8 måneder. Der er ingen planlagt kontrol efter denne operation – men vi anbefaler, at hørelsen og drænet bliver kontrolleret hos egen ørelæge eller på Capiro omkring en måned efter operationen.

Hvis der skulle opstå problemer med øret efter udskrivelsen, kan du kontakte Capiro.

KONTAKT

Hellerup: 3977 7070

Odense: 6548 7070

Aarhus: 8612 1186

Skørping: 9839 2244

Viborg: 8725 0899

Telefontider:

Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00

Fredag kl. 8.00-16.00

info@capiro.dk

www.capiro.dk

○ **Hellerup**
Hans Bekkevolds Allé 2B
2900 Hellerup
Tlf.: 3977 7070

○ **Odense**
Pantheonsgade 25
5000 Odense C
Tlf.: 6548 7070

○ **Aarhus**
Margrethepladsen 3
8000 Aarhus C
Tlf.: 8612 1186

○ **MR Aarhus**
Morten Børups Gade 8
8000 Aarhus C
Tlf.: 8612 1200

○ **Viborg**
Stadion Allé 7
8800 Viborg
Tlf.: 8725 0899

○ **Skørping**
Himmerlandsvej 36
9520 Skørping
Tlf.: 9839 2244

info@capiro.dk • capiro.dk

Telefontider:

Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00

Fredag kl. 8.00-16.00

Revideret af PEL

Sidst revideret: 13. december 2020

Revideres igen: 13. december 2023

Version 2



Capiro

Del af Ramsay Santé