



# Undersøgelse af spiserør, mavesæk og tolvfangertarm

Gastroskopi



**Capiro**

Del af Ramsay Santé

Du skal have foretaget en undersøgelse af spiserør, mavesæk og tolvfingertarm - en såkaldt gastroskopi. Hensigten med denne vejledning er at forklare, hvad der foregår ved undersøgelsen.

Bortset fra små medfødte navlebrok, forsvinder brok aldrig af sig selv. Den eneste effektive behandling er operation.

## FORBEREDELSE

### Faste

For at kunne vurdere forholdene i mavesækken skal den være tom. Du må derfor ikke have spist eller drukket 6 timer før undersøgelsen.

### Medicin

Hvis du til daglig får vigtig medicin, for eksempel hjertemedicin, vanddrivende medicin eller smertestillende medicin, kan den tages indtil 2 timer før undersøgelsen med et glas vand.

Hvis du har sukkersyge og får Insulin, skal du tale med lægen. Får du sukkersyge-tabletter, skal du ikke tage din tablet om morgenen, men til næste måltid.

Hvis du får blodfortyndende medicin, bedes du oplyse dette til lægen, sygeplejersken eller sekretæren, når der bookes tid.

### Tænder

Hvis du har fået indsat kroner eller stifttænder, fået lavet broarbejde eller lignende, skal vi bede dig oplyse lægen herom. Hvis du har tandprotese, fjernes denne før undersøgelsen.

Til beskyttelse af dine tænder og gastroskopet vil du få en tandbeskytter i munden.

### Ventetid


I tilfælde af uventede situationer kan der forekomme ventetid. Du vil da blive nærmere orienteret af personalet.

## SELVE UNDERSØGELSEN

Før, under og efter undersøgelsen får du målt blodtryk og puls.

Vi anbefaler, at du bliver lokalbedøvet i halsen med en spray. Hermed dæmpes svælg-reflekserne. Hvis du ønsker beroligende medicin, får du lagt en kanyle i en blodåre i armen. Du vil da døse lidt under undersøgelsen.

Under undersøgelsen ligger du på venstre side. Når medicinen virker, vil lægen føre gastroskopet gennem mund, svælg, spiserør og mavesæk ned til tolvfingertarmen. Gennem gastroskopet blæses luft ned i maven, for at lægen kan få et bedre overblik over mavesækkens indre. Det kan give anledning til, at det spænder lidt i maven. Du kan også få trang til at bøvse. Luften suges ud igen, inden gastroskopet tages op.



### Hvad er et gastroskop?

Undersøgelsen udføres med et såkaldt gastroskop. Et gastroskop er en bøjelig slange med et kamera i spidsen. Gastroskopet er knapt 1,5 cm tykt.

Der kan gennem gastroskopet tages vævsprøver af slimhinden til undersøgelse under et mikroskop. Nogle sygdomme, f.eks. blødning fra et mavesår, kan direkte behandles gennem gastroskopet.

## **Hvor lang tid varer undersøgelsen?**

Undersøgelsen varer sjældent mere end 10 minutter.

## **Gør det ondt?**

Nej. Det kan dog være lidt ubehageligt at få gastroskopet ført ned gennem svælget. Under undersøgelsen kan det spænde noget, fordi der er blæst luft ned i maven.

Du vil under undersøgelsen kunne trække vejret helt normalt.

## **EFTER UNDERSØGELSEN**

Hvis du har fået lokalbedøvelse i halsen, må du ikke spise eller drikke en time efter undersøgelsen. Det er for at undgå at få maden i "den gale hals".

Hvis du ikke har fået beroligende medicin, kan du forlade klinikken og genoptage normal aktivitet. Hvis du har fået beroligende medicin, bør du have nogen til at ledsage dig hjem. Medicinen nedsætter din dømmekraft resten af dagen, og du må derfor ikke køre bil.

Før du forlader klinikken, får du en lægesamtale om resultatet af undersøgelsen og om eventuelle forholdsregler efter undersøgelsen.

## **RISICI**

Ved gastroskopi forekommer der sjældent komplikationer - kun i 1 ud af 10.000 tilfælde. Det kan være overfølsomhed eller kraftig reaktion over for den beroligende medicin, hul på spiserør/mavesæk eller blødning fra slimhinden. Disse komplikationer viser sig ved svære mavesmerter, blodige eller sorte opkastninger eller høj feber. Skulle du få et eller flere af disse symptomer, bedes du henvende dig på nærmeste skadestue.

I meget sjældne tilfælde kan der opstå tandskade ved gastroskopi. Skulle du blive opmærksom på noget sådant, skal du straks henvende dig til Capio for at få nærmere vejledning.

## **KONTAKT**

Er der noget, du er i tvivl om, eller har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os.

Hellerup: 3977 7070

Odense: 6548 7070

Aarhus: 8612 1186

Skørping: 9839 2244

Viborg: 8725 0899

Telefontider:

Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00

Fredag kl. 8.00-16.00

[info@capio.dk](mailto:info@capio.dk)

[www.capio.dk](http://www.capio.dk)

○ **Hellerup**  
Hans Bekkevolds Allé 2B  
2900 Hellerup  
Tlf.: 3977 7070

○ **Odense**  
Pantheonsgade 25  
5000 Odense C  
Tlf.: 6548 7070

○ **Aarhus**  
Margrethepladsen 3  
8000 Aarhus C  
Tlf.: 8612 1186

○ **MR Aarhus**  
Morten Børups Gade 8  
8000 Aarhus C  
Tlf.: 8612 1200

○ **Viborg**  
Stadion Allé 7  
8800 Viborg  
Tlf.: 8725 0899

○ **Skørping**  
Himmerlandsvej 36  
9520 Skørping  
Tlf.: 9839 2244

[info@capiro.dk](mailto:info@capiro.dk) • [capiro.dk](http://capiro.dk)

**Telefontider:**

Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00

Fredag kl. 8.00-16.00

