

Information om kontrast

I forbindelse med din MR-scanning, skal du have en kontrastindsprøjtning. Vi beder dig læse nedenstående grundigt som forberedelse til din undersøgelse.

Vi anvender udelukkende kontraststof, når vi anser det for værende afgørende for undersøgelsen.

Vi anvender de kontraststoffer, som Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har klassificeret som værende de sikreste.

Injektionen af kontrast udføres kun, hvis du samtykker hertil.

Blodprøve

Hvis du har en nyresygdom eller diabetes, skal du have taget en blodprøve, som viser din nyrefunktion. Du bedes derfor henvende dig på et af de regionale blodprøvesteder og få taget en blodprøve.

[Du kan se de regionale blodprøvesteder her.](#)

OBS! Blodprøven må højst være en måned gammel på undersøgelsesdagen.

Bivirkninger

Lige som ved anden medicin kan du i enkelte tilfælde få bivirkninger, som forbigående kvalme og/eller hovedpine.

Udskillelse af kontraststof

Den kontrastvæske, du får indsprøjtet, bliver udskilt via urinen. Kontrastvæsken farver ikke urinen, og der er ikke nogen forholdsregler hverken før eller efter undersøgelsen.

Amning

Hvis du ammer, anbefaler vi, at du malker ud de første tre gange.

Patienter med svær nyresygdom

Hvis du har svær nyresygdom, kan du i meget sjældne tilfælde udvikle sygdommen Nefrogen Systemisk Fibrose. Vi giver ikke MR-kontraststoffer til patienter, som har svær nyresygdom, da de har den højeste risiko for at få sygdommen (dette kontrolleres ved den blodprøve, du skal have taget forud for undersøgelsen).