

Sårbehandling med levertransalve 25 % - til rene sår, hvor der samtidig kan være blottet sene/knogle/brusk

Vejledning

For at såret kan få så gode helingsbetingelser som muligt, er det afgørende, at nedenstående fremgangsmåde følges.

Fremgangsmåde

- Såret renses med vand og duppes tørt med et rent håndklæde eller gaze
- Levertransalve 25 % fordeles på/fedtes ind i et stykke affedt vaselinegaze. Dette gøres ved at "trykke" det oprindelige fedtstof af gazen og derefter fordele levertransalve 25 % ind i nettet
- Denne "forbinding" lægges KUN på såret/defekten med salen mod sårfladen og dækkes derefter med flere lag vaselinegaze samt en yderforbinding
- Den omkringliggende hud skal holdes tør for at undgå opblødning af vævet (maceration)
- Er det sene-/knogle-/bruskblottelse til stede i defekten, skal der være rigelig Levertransalve 25 % på vaselinegazen for at holde den blottede sene/knogle/brusk konstant fugtig. Dette har vital betydning for, at senen/knoglen/brusken kan overleve og ikke tørrer ud.
- Behandlingen varetages hver _____ dag
- Når defekten er granulerende og i hudniveau, seponeres levertransalven