



# Kikkertundersøgelse af endetarm og tyktarm

## Koloskopi





## HVAD ER EN KOLOSKOPI?

En koloskopi er en kikkertundersøgelse af ende- og tyktarm. Gennem en bøjelig fiberslange med kamera i spidsen kan lægen/skopisygeplejersken se tarmslimhinden, tage vævsprøver og fjerne eventuelle polypper.

Der er en minimal (1 %) risiko for, at der ved undersøgelsen kan gå hul på tarmen. Endvidere er der en lille risiko for blødning, hvis der tages prøver fra tarmen.

## FORBEREDELSE TIL UNDERSØGELSEN

### Udrensning

Det er vigtigt, at der ikke er afføring i tarmen, når koloskopien udføres. Se vejledning til udrensning på næste side.

**OBS:** Du skal følge vejledningen for udrensning, der er i denne pjece, og ikke vejledningen i Picoprep-pakken.

### Kost

Du må spise almindelig mad, indtil du skal begynde udrensningen. Dog må du ikke spise jerntabletter, kerneholdig mad, fibertilskud og vindruer i 5 dage før undersøgelsen.

### Medicin

Du bedes medbringe en medicinliste på undersøgelsesdagen.

Får du blodfortyndende medicin (Plavix, Clopidogrel, Marevan), skal der i nogle tilfælde tages en kontrolblodprøve før undersøgelsen. Du bedes rådføre dig med din egen læge om dette.

Får du til daglig vigtig medicin, som f.eks. hjertemedicin, vanddrivende medicin eller smertestillende medicin, kan du tage denne på undersøgelsesdagen.

Har du insulinbehandlet sukkersyge, skal du tale med din egen læge om, hvordan du skal forholde dig vedr. dette.

Får du tabletter mod sukkersyge, skal du ikke tage din tablet om morgenen på undersøgelsesdagen, men først ved næste måltid, altså efter undersøgelsen.

Tager du p-piller, skal du også sikre dig imod graviditet på anden vis indtil næste menstruation. Pga. udrensningen kan p-pillens beskyttelse være nedsat.

Får du medicin for astma eller hjertekramper, bedes du medbringe dette.

Den medicin, du tager på udrensningsdagen, skal du indtage mere end 1 time før eller mere end 1 time efter indtagelse af udrensningsmidlet.

### Har du:

- svær hjertesygdom eller en ICD, svær nyresygdom, sukkersyge og problemer med at regulere blodsukker, bør du kontakte egen læge inden udrensningen.
- stomi, skal du kontakte afdelingen.

### Særlige forhold

Er du gravid, eller har du pacemaker, bedes du oplyse dette, når du møder til undersøgelsen. Det har betydning for valg af udstyr.

### FASTE

**Hvis du skal have foretaget koloskopi i fuld bedøvelse, skal du være fastende.**

Det vil sige, at du ikke må:

- spise fast føde eller indtage mælkeprodukter i 6 timer før undersøgelsen
- drikke væske såsom vand, saft og kaffe/te i 2 timer før undersøgelsen

**Hvis du skal have foretaget både koloskopi og gastrokopi, skal du ligeledes være fastende (se fasteregler ovenfor).**

### Ventetid


I tilfælde af uventede situationer kan der forekomme ventetid. Du vil da blive orienteret af personalet.

### UDRENSNING FØR KOLOSKOPI

Din tarm skal være udrenset, for at lægen/skopi-sygeplejersken kan se tarmvæggen.

### Forberedelse til undersøgelsen:

Tyktarmen skal være helt udrenset, for at undersøgelsen kan gennemføres.



5 dage før undersøgelsen må du ikke spise vindruer, jerntabletter, fibertilskud og brød med hele kerner. Kernerne kan stoppe skopets sugekanaler.

Vær opmærksom på, at du muligvis ikke kan gå på arbejde i dagene op til undersøgelsen, da udtømningen vil kræve hyppige toiletbesøg. Det er forskelligt, hvor hurtigt udtømningen virker.

Udrensningen kan gøre dig sløj og træt.

#### Sådan tager du Picoprep:

1. Tag et glas med 1,5 dl koldt vand
2. Hæld pulveret fra brevet i vandet
3. Rør blandingen i 2-3 minutter
4. Når det ikke længere bruser, er blandingen færdig. Drik blandingen; helst inden for 15 minutter
5. Drik minimum 1-1,5 liter klar væske fordelt over de næste timer efter hvert brev. Dette vil give dig mange tynde afføringer efter 1-3 timer

Afføringen skal være vandtynd, for at udrensningen er fuldstændig. Hvis dette ikke er tilfældet, bedes du drikke yderligere tynde væsker.

#### [Når undersøgelsen skal finde sted mellem kl. 08.00 og kl. 12.00:](#)

##### DAGEN FØR UNDERSØGELSEN

- Du må **indtil kl. 11.00** spise kost bestående af f.eks. kogt, lyst kød (kylling eller fisk), pasta, lyst brød (f.eks. toast) og kogt æg
- Efter kl. 11:00 må du ikke spise fast føde, men skal drikke rigeligt med tynde væsker såsom: bouillon/klar suppe uden fyld, vand, saft, sodavand, te og kaffe. Gerne sukkerholdige væsker, men ingen mælkeprodukter!
- Kl. 14.00: Tag det første brev Picoprep (følg vejledningen i denne pjece)
- Kl. 20.00: Tag det andet brev Picoprep

##### PÅ UNDERSØGELSESDAGEN

###### Morgen

Hvis du ikke skal være fastende: Du må spise et let morgenmåltid (dvs. et stykke brød, kaffe/te) **1-2 timer før undersøgelsen** og tage evt. medicin som normalt.

#### [Når undersøgelsen skal finde sted mellem kl. 12.00 og kl. 16.00:](#)

##### DAGEN FØR UNDERSØGELSEN

- Du må **indtil kl. 15.00** spise kost bestående af f.eks. kogt, lyst kød (kylling

eller fisk), pasta, lyst brød (f.eks. toast) og kogt æg

- Efter kl. 15:00 må du ikke spise fast føde, men skal drikke rigeligt med tynde væsker såsom: bouillon/klar suppe uden fyld, vand, saft, sodavand, te og kaffe. Gerne sukkerholdige væsker, men ingen mælkeprodukter!
- Kl. 19:00: Tag det første brev Picoprep (følg vejledningen på foregående side)
- Kl. 07:00: Tag det andet brev Picoprep (på undersøgelsesdagen)

## PÅ UNDERSØGELSESDAGEN

Du må ikke spise morgenmad.

### Frokost

Hvis du ikke skal være fastende: Du må spise en let frokost (dvs. et stykke brød, kaffe/te) **1-2 timer før undersøgelsen** og tage evt. medicin som normalt.

[Når undersøgelsen skal finde sted mellem kl. 16.00 og kl. 20.00:](#)

## DAGEN FØR UNDERSØGELSE

- Du må **indtil kl. 19.00** spise kost bestående af f.eks. kogt lyst kød (kylling eller fisk), pasta, lyst brød (f.eks. toast) og kogt æg
- Efter kl. 19:00 må du ikke spise fast føde, men skal drikke rigeligt med tynde væsker såsom: bouillon/klar suppe uden fyld, vand, saft, sodavand, te og kaffe.

Gerne sukkerholdige væsker, men ingen mælkeprodukter!

- Kl. 21:00: Tag det første brev Picoprep (følg vejledningen på foregående side)
- Kl. 09:00: Tag det andet brev Picoprep (på undersøgelsesdagen)

## PÅ UNDERSØGELSESDAGEN

Du må ikke spise morgenmad.

### Frokost

Hvis du ikke skal være fastende: Du må spise en let frokost (dvs. et stykke brød, kaffe/te) **1-2 timer før undersøgelsen** og tage evt. medicin som normalt.

## UNDERSØGELSE


### Hvordan foregår en koloskopi?

Under undersøgelsen sidder en sygeplejerske hos dig. Du skal ligge på venstre side eller på ryggen under undersøgelsen. Der bliver lagt en tynd kanyler i en blodåre på armen, hvori der evt. kan gives beroligende og smertestillende medicin. Herefter fører lægen koloskopet ind i tarmen.

I nogle tilfælde undersøges den sidste del af tynd-tarmen også.

### Gør det ondt?

Undersøgelsen kan være forbundet med ubehag i form af oppustethed og eventuelle smerter. Vi tilbyder dig derfor afslappende og smertestillende medicin, da det gør undersøgelsen nemmere og bedre for dig.



Under undersøgelsen blæses lidt luft ind i tarmen. Det kan give en trykkende fornemmelse og give trang til at slippe af med luften. Før undersøgelsen afsluttes, suges luften ud igen.

### **Hvor lang tid varer undersøgelsen?**

Undersøgelsen varer mellem 30 og 60 minutter.

### **Efter undersøgelsen**

Du kan have en del luft i tarmen, som kan give mavekneb og ubehag i timerne efter undersøgelsen.

Du må spise og drikke, som du plejer.

### **Har du fået afslappende/smertestillende medicin, skal du være opmærksom på følgende:**

- Du skal observeres i afdelingen mindst en time efter, medicinen er givet
- Bilkørsel og maskinbetjening frarådes i 24 timer efter, medicinen er givet. *Du skal derfor have en aftale om afhentning i afdelingen og transport hjem efter undersøgelsen*
- Medicinen kan medføre, at du har svært ved at huske det første døgn. *Vi fraråder dig derfor at træffe vigtige beslutninger (f.eks. at underskrive papirer) det første døgn efter, du har fået medicinen*

### **Besked om undersøgelsesresultatet**

Lægen kan med det samme fortælle, hvad undersøgelsen har vist, og om der skal iværksættes behandling.

Hvis der er taget vævsprøver eller fjernet polypper, vil der gå ca. 14 dage, inden svaret foreligger, og det aftales, hvordan du får svaret.

### **Risiko ved koloskopi**

Koloskopi er en meget sikker undersøgelse. I sjældne tilfælde kan der dog forekomme komplikationer som f.eks. bivirkninger til den beroligende og smertestillende medicin.

Blødning eller hul på tarmen kan forekomme; især hvis der er fjernet polypper eller udført anden behandling i forbindelse med koloskopien. I visse tilfælde kan sådanne

komplikationer nødvendiggøre akut operation.

Hvis du får blødning fra tarmen eller svære mavesmerter, skal du kontakte egen læge eller ringe 1813/lægevagten.

### **KONTAKT**

Er der noget, du er i tvivl om, eller har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os.

Hellerup: 3977 7070

Odense: 6548 7070

Aarhus: 8612 1186

Skørping: 9839 2244

Viborg: 8725 0899

Telefontider:

Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00

Fredag kl. 8.00-16.00

[info@capiro.dk](mailto:info@capiro.dk)

[www.capiro.dk](http://www.capiro.dk)



○ **Hellerup**  
Hans Bekkevolds Allé 2B  
2900 Hellerup  
Tlf.: 3977 7070

○ **Odense**  
Pantheonsgade 25  
5000 Odense C  
Tlf.: 6548 7070

○ **Aarhus**  
Margrethepladsen 3  
8000 Aarhus C  
Tlf.: 8612 1186

○ **MR Aarhus**  
Morten Børups Gade 8  
8000 Aarhus C  
Tlf.: 8612 1200

○ **Viborg**  
Stadion Allé 7  
8800 Viborg  
Tlf.: 8725 0899

○ **Skørping**  
Himmerlandsvej 36  
9520 Skørping  
Tlf.: 9839 2244

[info@capiro.dk](mailto:info@capiro.dk) • [capiro.dk](http://capiro.dk)

**Telefontider:**

Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00

Fredag kl. 8.00-16.00

