



Medicinprovokation

Udredning for medicinallergi



VELKOMMEN TIL CAPIO LUNGE- OG ALLERGIAMBULATORIUM

Du har fået en henvisning til udredning for medicinallergi hos os. I materialet her informerer vi dig om, hvad der skal ske i forbindelse med dit første besøg, og hvilke forberedelser du skal gøre dig. Husk, at du altid er velkommen til at kontakte os, hvis der er noget, du er i tvivl om.

HVAD ER MEDICINALLERGI?

Medicinallergi er en overfølsomhedsreaktion, der kan vise sig på flere måder, såsom nældefeber, hudkløe, hævelser og besvimelse.

HVORDAN STILLES DIAGNOSEN?

Ud fra din sygehistorie og resultatet af en blodprøve planlægges dit videre forløb.

Hvis din blodprøve er positiv, er allergien oftest bekræftet.

Hvis din blodprøve er negativ, vil vi ofte gå videre med en provokationstest. Er din provokationstest positiv, er allergien bekræftet.

FORBEREDELSE INDEN DIT FØRSTE BESØG

Du skal have taget en blodprøve på dit lokale sygehus/sundhedshus.

Du skal holde pause med medicin:

- Antihistamin: 3 døgn
- Steroidcreme (kun arme): 7 døgn
- ACE-hæmmer (fx ramipril, enalapril, lisinopril m.m.): 1 døgn

Du må gerne tage din astmamedicin og næsespray som vanligt.

Kontakt os ved tvivlsspørgsmål.

FEBER/SYGDOM PÅ SELVE DAGEN?

Hvis du får feber eller bliver syg op til/på dagen for fremmøde, skal du ringe til os.

FØRSTE BESØG: HVAD SKAL DER SKE?

Du kommer til samtale ved **speciallægen**. Din blodprøve bliver vurderet, og du får lavet en **pusteprobe** (lungefunktionsundersøgelse). Der kan også blive behov for at lytte på dit hjerte/lunger.

Oftest er der behov for at lave en **provokationstest**, hvor du i trygge og sikre rammer

udsættes for medicinen i ofte små, men stigende, doser. Testen foretages hyppigst på selve dagen, men har din mulige overfølsomhedsreaktion været alvorlig, foretages testen over to forskellige separate dage.

Hvis du ikke reagerer på provokationstesten, skal du oftest have en almindelig kur med medicinen i dit hjem.

ER PROVOKATIONSTESTEN FARLIG?

Erfaringsmæssigt ser vi små overfølsomhedsreaktioner hos 1 ud af 10 personer under provokationstesten.

Oftest er der tale om helt små reaktioner, såsom lidt nældefeber eller hudkløe, der hurtigt fjernes med en tablet Antihistamin.

I det uhyre sjældne tilfælde, at reaktionen er kraftigere, står vores erfarne personale klar til hurtigt at gribe ind.

Hjemmetesten er aldrig farlig, og du vil altid få allergimedisin i beredskab.

HVOR LANG TID TAGER UDREDNING?

Udredningstiden afhænger af sværhedsgraden af din mulige reaktion samt antallet af medicintyper, du skal testes for:

- Besøg uden provokationstest: ½ time
- Besøg med provokationstest: 2½-3½ time

Under provokationstesten er der en del ventetid. Husk derfor at medbringe madpakke, iPad, strikketøj, bøger, PC og lignende.

KONTAKT

Er der noget, du er i tvivl om, eller har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til os.

Se kontaktinformationer på bagsiden.

○ **Hellerup**
Hans Bekkevolds Allé 2B
2900 Hellerup
Tlf.: 3977 7070

○ **Odense**
Pantheonsgade 25
5000 Odense C
Tlf.: 6548 7070

○ **Aarhus**
Margrethepladsen 3
8000 Aarhus C
Tlf.: 8612 1186

○ **MR Aarhus**
Morten Børups Gade 8
8000 Aarhus C
Tlf.: 8612 1200

○ **Viborg**
Stadion Allé 7
8800 Viborg
Tlf.: 8725 0899

○ **Skørping**
Himmerlandsvej 36
9520 Skørping
Tlf.: 9839 2244

info@capiro.dk • capiro.dk

Telefontider:

Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00

Fredag kl. 8.00-16.00

