



Operation af mundens spytkirtel



SYGDOMMEN

Glandula submandibularis, mundbundens spytkirtel, ligger bagtil på undersiden af kæben og har udførselsgang i en slimhindefold på undersiden af tungen ved tungebåndet. Infektion i spytkirtlerne kan skyldes bakterier - særligt når en spytkirtel er skadet som følge af spytsten - eller når kroppens modstandskraft over for infektioner er nedsat pga. andre sygdomme.

En spytkirtel med infektion er hævet og øm. Ofte er halsens lymfekirtler også forstørrede og ømme, og der kan være udflåd af puds fra den angrebne spytkirtel, hvilket kan give en dårlig smag i munden. Hvis infektionen ikke behandles, kan spytkirtlen skades så voldsomt, at den holder op med at fungere. Stærkt krydret mad og citrusfrugter, som øger kravet til spytproduktion, forværrer hævelsen og smerten.

INFEKTIONER OG SPYTSTEN

I mundbundens spytkirtler kan der opstå gener på grund af sten i udførselsgangen eller som følge af tilbagevendende infektioner, som gør, at spytkirtlen er konstant forstørret eller giver smerter.

Bakterieinfektioner i spytkirtlerne kan i reglen behandles med antibiotika. Man kan også forsøge at udvide spytkirtlens udførselsgang ved hjælp af en sonde.

Når man har fået bugt med infektionen, genoptager spytkirtlen sin normale funktion. Hvis en større del af kirtelvævet er gået tabt og blevet erstattet af arvæv, kan kirtlens funktion dog forringes.

Hvis der er sten vil de oftest kunne ses ved en ultralydsscanning. Sten kan forsvinde af sig selv, men ofte er det nødvendigt at fjerne stenen med hele kirtlen for at undgå fremtidige gener.

FORUNDERSØGELSEN

Ved forundersøgelsen mærker øre-næse-hals-kirurgen på kirtlen, og der vil evt. blive taget en prøve, som sendes til undersøgelse. Du kan også blive sendt til en ultralydsscanning før operation.

FORBEREDELSE

Hvis du har skæg omkring spytkirtlen, skal det barberes væk aftenen før operationen.

Hvis du er i behandling med blodfortyndende eller blodpropforebyggende medicin, vil du

ved forundersøgelsen blive informeret om, hvorvidt du evt. skal nedtrappe eller holde pause med medicinen.

FØR OPERATIONS DAGEN

Undgå alle former for naturmedicin, fiskeolie, E-vitamin, glucosaminsulfat, ingefær, chiafrø, hvidløg, ginseng, gingko biloba og Q10, idet disse præparater kan øge blødningstendensen. En uge efter operationen må du tage præparaterne igen.

OPERATION OG DRÆN

For at undgå hævelse på hals efter operationen indlægges nogle gange et dræn/ plastikslange med et svagt sug i operationssåret, inden det syes sammen.

Spytkirtlen sendes til mikroskopisk undersøgelse.

RISICI UNDER OPERATIONEN

Den største af mundbundens spytkirtler ligger under kæben. Ved operationen kommer man i kontakt med tre forskellige nerver. Den første hører til de ansigtsmuskler, der styrer ansigtets mimik. Under operationen er der risiko for, at nerven bliver trykket, og det kan medføre en kortvarig lammelse af mundvigen. Der er en lille risiko for at nerven bliver skåret over under operationen, og det betyder, at mundvigen kommer til at hænge.

Lidt dybere under kirtlen ligger den nerve, der fører til tungen og videresender smagsindtryk til hjernen. Lige ved siden af den ligger den nerve, der har med tungens bevæ-

gelseser at gøre. Disse to nerver reagerer på samme måde ved tryk eller klem og kan periodisk ophøre med at fungere. Bliver disse to nerver skåret over under operationen, hvilket heldigvis sker meget, meget sjældent, betyder det vedvarende gener i form af smagsforstyrrelser og manglende kontrol over tungen.

FORVENTNINGER TIL RESULTAT

Efter operationen er følesansen på kæben og i et område omkring operationsarret ophevet. Følesansen i huden på kæben normaliseres inden for 2-4 måneder.

EFTERBEHANDLING

Du bliver som hovedregel syet med indvendige sting, som ikke skal fjernes. Såret bliver dækket med plaster, som så vidt muligt skal holdes tørt. Du kan selv fjerne plasteret 10 dage efter operationen.

UDSKRIVELSEN

Du bliver udskrevet dagen efter operationen, hvor et eventuelt dræn normalt kan fjernes.

Ved udskrivelsen sikrer sygeplejersken, at du har en tid til ambulante kontrol med svar på den mikroskopiske undersøgelse af det fjernede væv.

Et normalt sårhelingsforløb varer 2-3 uger. Der kan op til 3 måneder efter føles diskrete smerter, kløe og irritation.

EFTERFORLØB OG RISIKO FOR KOMPLIKATIONER EFTER OPERATIONEN

Det er almindeligt, at der er hævelser ved operationsarret, og at der vil være nedsat følesans i huden omkring arret.

Hvis du får komplikationer i form af

- feber over 38°C
- dunkende smerter i og omkring operationssåret
- tiltagende rødme og hævelse omkring operationssåret (eller senere arret)

skal du kontakte os telefonisk.

Operationsarret bliver pæneste, hvis du undgår at udsætte det for direkte sollys et år efter operationen.

SYGEMELDING

Vi anbefaler sygemelding i 2 uger efter operationen.

KONTAKT

Hellerup: 3977 7070

Odense: 6548 7070

Aarhus: 8612 1186

Skørping: 9839 2244

Viborg: 8725 0899

Telefontider:

Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00

Fredag kl. 8.00-16.00

info@capio.dk

www.capio.dk

○ **Hellerup**
Hans Bekkevolds Allé 2B
2900 Hellerup
Tlf.: 3977 7070

○ **Odense**
Pantheonsgade 25
5000 Odense C
Tlf.: 6548 7070

○ **Aarhus**
Margrethepladsen 3
8000 Aarhus C
Tlf.: 8612 1186

○ **MR Aarhus**
Morten Børups Gade 8
8000 Aarhus C
Tlf.: 8612 1200

○ **Viborg**
Stadion Allé 7
8800 Viborg
Tlf.: 8725 0899

○ **Skørping**
Himmerlandsvej 36
9520 Skørping
Tlf.: 9839 2244

info@capiro.dk • capiro.dk

Telefontider:
Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00
Fredag kl. 8.00-16.00

