



Operation i ørespytkirtlen

(parotis)



KÆRE PATIENT

Knuder i ørespytkirtlen er langt overvejende godartede (ca. 80 %). Forud for en evt. operation skal du have gennemgået en klinisk undersøgelse. Der vil inden operation være taget en finnålspunkttur (nåleprøve) for at undersøge, om det drejer sig om en godartet eller ondartet knude. Får en knude lov til at sidde, kan den vokse og udarte sig i ondartet retning.

OPERATIONEN

Igennem ørespytkirtlen forløber nervus facialis, som er nerven til ansigtets muskler. Den deler kirtlen i en større, overfladisk og en mindre, dybere del. De fleste knuder sidder i den overfladiske del.

Ved fjernelse må man identificere og frilægge ansigtsnerven for at undgå beskadigelse af denne. Trods alle forholdsregler kan beskadigelse af nerven ikke fuldstændig udelukkes, men heldigvis forekommer det yderst sjældent, at der opstår varige mén efter en operation.

For at sikre sig, at hele knuden fjernes, fjernes også et mindre stykke af det omgivende spytkirtelvæv, idet ansigtsnerven bevares.

For at optimere oversigtsforholdene er det oftest nødvendigt at dele af følenerven til øreflippen overskæres, hvilket medfører nedsat følesans i øreflippen.

For at undgå hævelse på halsen indlægges ofte et dræn med et svagt sug. Drænet fjernes oftest dagen efter operationen.

BEDØVELSE

Operationen foregår i helbedøvelse. Under hele bedøvelsen vil du blive overvåget af anæstesilægen. Læs folderen "Information om fuldbedøvelse og spinalbedøvelse".

I mange tilfælde er det fordelagtigt at kombinere helbedøvelse med lokalbedøvelse – særligt for at mindske ubehag og smerter efter operationen.

Under operationen bliver der lagt lokalbedøvelse i operationsfeltet. Dette medvirker til at fjerne sårsmerten i de første vigtige timer efter operationen.

OPVÅGNINGEN

Når operationen er afsluttet, vågner du af narkosen og kommer efter kort tid til sengeafsnittet, hvor du vil blive overvåget af specielt uddannet personale.

Enkelte patienter kan efter bedøvelsen få kvalme og opkastning. Er der optræk til kvalme, vil du blive tilbudt kvalmestillende medicin.

Umiddelbart efter operationen kan der komme en nedsat funktion af ansigtsnerven på den side, du er opereret. Den ene mundvig kan komme til at "hænge" lidt. I langt de fleste tilfælde er ansigtsfunktionen helt normal igen inden for 3 mdr.

SMERTEBEHANDLING EFTER OPERATION - NÅR DU KOMMER HJEM

Den smertebehandling, der skal gøre det nemmere at komme igennem de første dage efter operationen, påbegyndes allerede før operationen med den Panodil-dosis, anæstesilægen anbefaler. Vi anvender den medicin, der er anført herunder.

Under indlæggelsen bruges også stærkere smertestillende midler fra morfin-gruppen, men det er kun nødvendigt i timerne under og lige efter operationen.

Mod smerter anbefales Panodil® og Ibumetin® - et gigtmiddel som virker godt på smerter i halsen.

Voksne

Tbl. Panodil 1 g, 4 gange dgl. (altså ca. hver 6. time) suppleret med Tbl. Ibumetin 400 mg, 3 gange dgl.

NB! Den anførte dosis er maksimumdosis.

FJERNELSE AF STING

Sædvanligvis er såret syet med tråde, som opløser sig selv, og såret er holdt sammen med Steristrips (en slags plaster).

Er der sting tilbage ved den ambulante kontrol, fjernes de der.

KOMPLIKATIONER TIL OPERATIONEN

Blødning og infektion er komplikationer, som kan opstå ved alle kirurgiske indgreb. Disse forekommer heldigvis sjældent ved ørespytkirtelkirurgi.

Den mest alvorlige komplikation er naturligvis overskæring af ansigtsnerven. Som anført er det en yderst sjældent forekommende komplikation, men i forbindelse med operationen kan man manipulere så meget med nerven, at den forbigående har nedsat funktion. Funktionen kommer dog ret hurtigt tilbage.

Derudover har man nedsat følesans sv.t. øreflippen, hvilken af nogle opfattes som "papøre".

På længere sigt kan man udvikle et såkaldt Freys syndrom, som er abnorm svedtendens i forbindelse med fødeindtagelse. Svedtendensen er lokaliseret til kinden, hvor du er opereret.

FORVENTNINGER TIL RESULTAT

Efter operationen er følesansen oftest ophævet på det ydre øre ("papøre") og i et område omkring operationsarret.

Følesansen på ydre øre vil ofte være permanent nedsat, mens følesansen i ansigtshuden normaliseres inden for 2-4 måneder.

EFTERBEHANDLING

Udover almindelig kirurgisk kontrol er der ingen efterbehandling. Naturligvis er det fjernede væv sendt til mikroskopisk undersøgelse.

KONTROL

Du skal til kontrol 8-10 dage efter operationen, hvor steristrips fjernes, og vævsprøvesvar meddeles.

PROBLEMER EFTER UDSKRIVELSE

Hvis der skulle opstå problemer omkring operationsstedet, efter du er udskrevet, eller du har spørgsmål, der ikke kan vente til næste kontroltid, kan du kontakte Capio.

KONTAKT

Hellerup: 3977 7070

Odense: 6548 7070

Aarhus: 8612 1186

Skørping: 9839 2244

Viborg: 8725 0899

Telefontider:

Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00

Fredag kl. 8.00-16.00

info@capio.dk

www.capio.dk

○ **Hellerup**
Hans Bekkevolds Allé 2B
2900 Hellerup
Tlf.: 3977 7070

○ **Odense**
Pantheonsgade 25
5000 Odense C
Tlf.: 6548 7070

○ **Aarhus**
Margrethepladsen 3
8000 Aarhus C
Tlf.: 8612 1186

○ **MR Aarhus**
Morten Børups Gade 8
8000 Aarhus C
Tlf.: 8612 1200

○ **Viborg**
Stadion Allé 7
8800 Viborg
Tlf.: 8725 0899

○ **Skørping**
Himmerlandsvej 36
9520 Skørping
Tlf.: 9839 2244

info@capiro.dk • capiro.dk

Telefontider:

Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00
Fredag kl. 8.00-16.00

Revideret af CBU

Sidst revideret: 11. december 2020

Revideres igen: 11. december 2023

Version 2



Capio

Del af Ramsay Santé