



Provokeret abort

(Kirurgisk indgreb)



PROVOKERET ABORT

Ifølge gældende lovgivning kan der udføres provokeret abort før udgangen af 11. graviditetsuge. Provokeret abort kan foregå enten som medicinsk abort eller kirurgisk ved en udskrabning/udsugning af livmoderhulen. Medicinsk abort anbefales især før 9. graviditetsuge, mens kirurgisk abort ofte foretrækkes fra 9. til 11. fulde uge.

FØR OPERATIONEN

I forbindelse med forundersøgelsen foretages gynækologisk undersøgelse med ultralydsscanning til bestemmelse af graviditetsslængden. Sammen med gynækologen beslutter du, hvilken metode der er bedst egnet for dig. Anmodning om svangerskabsafbrydelse underskrives.

OPERATIONEN

Udskrabningen foretages i fuld bedøvelse, og der gives medicin, som trækker livmoderen sammen. Lægen udvider livmoderhalsen og fører et plastrør ind i livmoderen. Derefter bliver graviditeten suget ud. Hele indgrebet tager cirka 10 minutter.

EFTER OPERATIONEN

Efter indgrebet køres du til sengeafsnittet, hvor du overvåges, indtil du er klar til at blive afhentet - normalt efter få timer. Når du har været i fuld bedøvelse, må du ikke selv køre bil hjem, og du skal være under voksnet opsyn det første døgn.

Inden hjemsendelsen orienterer kirurgen dig om operationen og den efterfølgende plan. Du får en kopi af journalen udleveret, eller den vil blive sendt til dig efterfølgende, og du får smertestillende medicin med hjem til de første tre dage efter operationen.

Der kan være lette smerter og blødning efter indgrebet. Det er normalt, at du bløder svarende til en normal menstruation i cirka en uge. Derefter vil det aftage, men du skal regne med at bløde i 2-3 uger.

MULIGE KOMPLIKATIONER

Underlivsinfektion eller kraftig blødning kan ses i sjældne tilfælde. En anden sjælden komplikation er, at der under operationen kan gå hul på livmoderen.

Denne komplikation kan bevirke, at der skal foretages en kikkertoperation, eller at du må blive på hospitalet ½-1 døgn til observation for blødning eller infektion.

FORHOLDSREGLER

Hvis du i tiden efter operationen oplever:

- kraftig blødning,
- feber over 38 grader eller
- kraftige underlivssmerter,

skal du kontakte Capiro, egen læge eller lægevagten i din region (akuttelefonen 1813, hvis du bor i Region H).

For at forebygge infektion anbefaler vi, at du, så længe du bløder:

- undgår ubeskyttet samleje,
- undgår karbad, havbad, spa og svømmehal og
- anvender hygiejnebind fremfor tamponer.

Efter et par dage kan du genoptage dine normale aktiviteter som arbejde, motion og lignende.

KONTAKT

Er der noget, du er i tvivl om, eller har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os eller den gynækolog, der har foretaget indgrebet.

Hellerup: 3977 7070

Odense: 6548 7070

Aarhus: 8612 1186

Skørping: 9839 2244

Viborg: 8725 0899

Telefontider:

Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00

Fredag kl. 8.00-16.00

info@capiro.dk

www.capiro.dk

○ **Hellerup**
Hans Bekkevolds Allé 2B
2900 Hellerup
Tlf.: 3977 7070

○ **Odense**
Pantheonsgade 25
5000 Odense C
Tlf.: 6548 7070

○ **Aarhus**
Margrethepladsen 3
8000 Aarhus C
Tlf.: 8612 1186

○ **MR Aarhus**
Morten Børups Gade 8
8000 Aarhus C
Tlf.: 8612 1200

○ **Viborg**
Stadion Allé 7
8800 Viborg
Tlf.: 8725 0899

○ **Skørping**
Himmerlandsvej 36
9520 Skørping
Tlf.: 9839 2244

info@capiro.dk • capiro.dk

Telefontider:

Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00
Fredag kl. 8.00-16.00

Udarbejdet af CP

Sidst revideret: 22. september 2020

Revideres igen: 22. september 2023

Version 3



Capio

Del af Ramsay Santé