



Capio

Privathospital

**Kikkertundersøgelse af
blæren**

(Cystoskopi)

Kikkertundersøgelse af blæren (Cystoskopi)

Denne folder giver dig information om, hvad der skal ske før, under og efter den undersøgelse, du skal have foretaget. Det er derfor vigtigt, at du har læst folderen grundigt, inden du møder på hospitalet.

For at du kan forberede dig bedst muligt, beder vi dig om også at læse folderen "Velkommen".

Formålet med undersøgelsen

Formålet med indgrebet er at undersøge blæren og urinrøret.

Undersøgelsen udføres ved hjælp af en bøjelig kikkert (et cystoskop), og blæren fyldes delvist med sterilt saltvand for at skabe overblik.

Hvis kirurgen finder det nødvendigt, kan der tages prøver fra blæren under undersøgelsen.

Hvis du op til undersøgelsen har mistanke om, at du har blærebetændelse, beder vi dig kontakte din egen læge angående behandling af dette.

Undersøgelsen kan stadig gennemføres, selv om du er i behandling for en blærebetændelse.

Undersøgelsesdagen

På dagen for undersøgelsen skal du tage et bad, hvor du vasker pung, penis, særligt området omkring urinrøret, grundigt samt vasker hår (hårvask kan gøres dagen inden).

Undersøgelsen varer ca. 10 minutter.

På undersøgelsesdagen vil du møde:

- Personale, der vil informere dig om forløbet og gøre dig klar til undersøgelsen
- Kirurgen, der skal undersøge dig

Medbragte værdigenstande opbevares på eget ansvar og vi opfordrer til, at du lader smykker og større kontantbeløb blive hjemme.

Efter undersøgelsen

Du kan tage hjem umiddelbart efter undersøgelsen. Inden du tager hjem, informeres du om undersøgelsens forløb og en eventuel videre plan.

Det første døgn efter undersøgelsen kan der forekomme svie og blødning ved vandladning. Dette er normalt og vil oftest forsvinde i løbet af ca. et døgn. For at reducere disse symptomer og

forebygge blærebetændelse, anbefales det at drikke mindst 2 liter væske i løbet af resten af dagen for undersøgelsen.

Svar på eventuelle prøver

Tiden indtil svaret på prøven foreligger kan variere, men oftest går der ca. 14 dage. Prøvesvaret tilgås elektronisk.

Sygemelding

Sædvanligvis er sygemelding ikke nødvendig efter undersøgelsen.

Komplikationer

Infektion

Efter indgrebet er der en lille risiko for at der kan opstå infektion i blæren (blærebetændelse).

Tegn på infektion:

- Tiltagende svien og smerter ved vandladning
- Eventuelt feber
- Mørk og ildelugtende urin
- Trykkende smerte over blæren
- Eventuel blødning, udover det forventede, i forbindelse med vandladning

Hvis du pga. infektion sættes i behandling med antibiotika af egen læge eller vagtlæge, må du gerne informere os, da vi registrerer komplikationer efter operationer for hele tiden at øge kvaliteten af vores behandling.

Egne notater

Her kan du notere dine eventuelle spørgsmål til os, så du kan huske dem, når vi taler sammen igen, eller du ankommer til din undersøgelse.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, du ønsker svar på.

Du kan finde vores kontaktinformationer på Capios hjemmeside:

www.capiro.dk

Version 4

Dato: november 2023

Revideres: november 2026

Udarbejdet af TVC og MJO

Godkendt af MJO