



Cario

Privathospital

**MR-skanning af
galdeveje
(MRCP)**

MR-skanning af galdeveje

En MR-skanner kan via et meget kraftigt magnetfelt og radiobølger undersøge dele af kroppen og fremstille detaljerede billeder af kroppens væv og organer.

MR-skanning af galdevejene varer ca. 30 minutter.

Forberedelse inden skanningen

Du skal møde fastende

For at skanningsbillederne bliver så brugbare som muligt, skal din mavesæk være tom. Derfor skal du faste, inden du møder til undersøgelsen, dvs.:

- Du må IKKE spise, drikke, ryge eller tygge tyggegummi 4 timer før skanningen.

Møder du ikke fastende, kan vi desværre blive nødt til at aflyse undersøgelsen.

Medicin

Tager du medicin dagligt, kan du fortsætte som vanligt, da det ikke påvirker MR-skanningen.

Metalgenstande i kroppen

Du kan muligvis ikke blive MR-skannet, hvis du har

- Pacemaker eller ICD-enhed
- Metalklips i hjernen
- Indopererede hjælpemidler som fx øreimplantat og insulinpumpe
- Elektroniske stimulatorer, man ikke kan fjerne eller afbryde
- Metalsplinter i øjne/krop
- Tandprotese med magnetisk tryklås
- Flere end 4 stents

Dette må du ikke have med/på ind i skannerrummet

- Alle former for magnetkort (Dankort, kreditkort m.m.)
- Hårpynt, smykker, ur og piercinger
- Tøj med metal fx lynlåse, knapper og metaltråde
- Høreapparater og brille

- Metalbandage
- Mobiltelefoner og anden elektronik
- Sportstøj, da det kan indeholde metalpartikler

Smykker og piercinger

Smykker og piercinger anbefales efterladt derhjemme, eller skal fjernes inden undersøgelsen. Det samme gælder makeup. Vi råder over omklædningsrum, hvor du kan lægge dine smykker og eventuelt efterlade beklædning, der indeholder metal.

Du kan godt blive skannet, selvom:

- Du har en spiral i livmoderen.
- Du har en kunstig hofte eller andre metalproteser.
- Du har plomber i tænderne.
- Du er blevet steriliseret.

Klaustrofobi

Lider du af klaustrofobi (angst for små, lukkede rum), kan det ofte afhjælpes med en beroligende pille. Pillerne kan fås ved henvendelse til egen læge.

Bemærk! Det er vigtigt, at din læge er informeret om din klaustrofobi, før du skal til undersøgelse på Capio.

Kontraststof

Inden skanningen vil lægen vurdere, om det er nødvendigt med kontrast. Ved visse undersøgelser kan det være nødvendigt at indsprøjte kontraststof i en blodåre i armen for at skabe bedre billeder af blodkar og væv. Skal du have kontrast, vil vi tale med dig om det inden undersøgelsen.

Under skanningen

Til selve skanningen bliver du lagt på et leje, som køres ind i MR-skanneren.

Under skanningen skal du holde vejret i nogle perioder, for at billedkvaliteten bliver bedst. Du vil blive vejledt i hvornår og hvordan.

Undersøgelsen er ellers fuldstændig smertefri og uden gener.

Dog er MR-skanneren støjende, så du vil få udleveret høreværn og/eller ørepropper.

Personalet vil hele tiden kunne se dig, og du har ligeledes mulighed for at komme i kontakt med dem under hele skanningen.

Lig stille under skanningen

Under skanningen er det vigtigt, at du ligger så stille som muligt. Bevæger du dig for meget, kan billederne blive slørede og svære at vurdere efterfølgende.

Efter skanningen

Der er ingen væsentlige forholdsregler, du bør tage, efter undersøgelsen. Har du fået en beroligende pille, må du dog ikke selv køre hjem efterfølgende.

Svar på skanningen

Du kan forvente at få svar på din MR-skanning indenfor 10-12 hverdage, da din læge først skal modtage beskrivelsen af dine billeder. Du vil enten få svaret fra egen læge eller hos den afdeling/speciallæge, der har henvist dig.

Egne notater

Her kan du notere dine eventuelle spørgsmål til os, så du kan huske dem, når vi taler sammen igen, eller du ankommer til din operation.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, du ønsker svar på.

Du kan finde vores kontaktinformationer på Capios hjemmeside:

www.capiro.dk